

BROTHEAS GRANULATUS Simon, 1877 • **ŠTÍR ZRNITÝ**

akva tera fórum

Čeleď: Chactidae (štírovití)**Řád:** Scorpiones (štíři)**Výskyt:** Jižní Amerika – Brazílie, Francouzská Guyana a Guyana. Uváděn byl také ze Surinamu a Venezuely.**Velikost:** 60 až 70 mm (měřeno bez klepet)**Pohlavní rozdíly:** Odlišení obou pohlaví může činit problémy. Samec má více zduřelý telson a nepatrně robustnější klepeta. Na fotografiích je samice.**Chov a odchov:** Jedná se o nenáročný druh štíra, který vyžaduje vlhké terárium o přibližných rozměrech 15x15x15 cm (d,v,š). Podkladem může být vyšší vrstva lignocelu (nebo lesní humus) s kousky kůry nebo suchými listy jako úkryty. Štíři mívají občas sklon ke kanibalismu, a tak, pokud nemůžete mláďatům zajistit dostatek až přebytek potravy, je vhodnější je chovat odděleně. Společný chov dospělců však většinou nečiní problém, pokud je ovšem dostatečně krmíme. Jako krmivo předkládáme menší cvrčky. Teplota může kolísat mezi 25 a 32 °C. Dospělosti dosahují štíři zpravidla po pátém nebo šestém svlékání ve stáří okolo jednoho roku.**Poznámky:** Tento druh se k nám vozí především z Francouzské Guyany, kde je poměrně hojný. Rod *Brotheas* C. L. Koch, 1837 zahrnuje 24 vzájemně dosti podobných druhů, které obývají severní část Jižní Ameriky. Jedná se o pralesní štíry, kteří jen vzácně šplhají a spíše se nacházejí v hrabance či okolo ležících větvích. Toxicky je celá čeleď nevyznamená.

František Kovařík

