

Čeleď: Chaerilidae (štírovití)**Řád:** Scorpiones (štíři)**Výskyt:** Asie – Bangladěš, Čína (Tibet), Indie**Velikost:** 38–65 mm (měřeno bez klepet)**Pohlavní rozdíly:** Jak můžete posoudit z fotografií obou pohlaví, samec má výrazně delší články zadní části zadečku a telson. Tento pohlavní dimorfismus známe (s výjimkou telsonu) spíše u jiných rodů štírů. V této čeleďi je zcela unikátní.**Chov a odchov:** Terárium vyhovuje vlhké, o přibližných rozměrech 15x15x15 cm (d,v,š). Podkladem může být vyšší vrstva lignocelu s kousky kůry nebo suchými listy, které slouží jako úkryty. Štíry je vhodnější chovat samostatně, ale je možný i společný chov. Teplota 25–30 °C, krmivo menší cvrčci. Získal jsem do chovu jen tři nedospělé jedince, z nichž dva dospěli v samce a třetím byla samice. Prozatím se odchov tohoto druhu nepodařil, což je velká škoda, jelikož se jedná o tvarově atraktivní a vzácný druh štíra. Myslím, že fotografie živých exemplářů se dosud v žádném časopise neobjevila. Přesto je nutné dodat, že chov druhů rodu *Chaerilus* je možný a jiné druhy se daří mně i jiným českým chovatelům úspěšně množit.**Poznámky:** Čeleď Chaerilidae včleňuje 19 druhů jediného rodu žijících od Indie po Malajsii. Z nich jeskynní druh *C. sabinae* ze Sulawesi, který měří 8 mm, je vůbec nejmenším druhem štíra. Velikosti jen okolo 25 mm dosahuje *C. petrzekai* z Vietnamu a *C. celebensis* z Filipín, Indonésie a Malajsie. Naopak největším je téměř osmicentimetrový *C. tichyi* z Malajsie. Toxický je celá čeleď nevýznamná.

František Kovařík

