

HETEROMETRUS FULVIPES (C. L. Koch, 1837) • VELEŠTÍR ŽLUTONOHÝ

akva tera fórum

Čeled: Scorpionidae (štírovití)

Řád: Scorpiones (štíři)

Výskyt: Asie – Indie; nově byl zjištěn také v Pákistánu.

Velikost: 70 až 100 mm (měřeno bez klepet)

Pohlavní rozdíly: Samec má jiné rozměry klepet, kdy femur a patella jsou delší než u samice. Samice je na velké a samec na menší fotografii.

Chov a odchov: Štíry chováme pohromadě i ve větších skupinách v jednoduše zařízeném teráriu s mírně vlhkým podkladem (lignocel) a několika většími kusy kůry. Tento druh nevyžaduje tak vysokou vlhkost jako běžně chované druhy rodu z Malajsie a Indonésie. Vyhovuje mu také mírně nižší teplota, která může kolísat v rozmezí od 22 do 28 °C. Mláďata, ale často i dospělci, si hloubí nory, proto je vhodnější vyšší vrstva substrátu. Do terária neumísťujeme kameny. Štír je často podhrabe, takže ho mohou zavalit.

Poznámky: Celý rod je toxicky nevýznamný a je možné všechny druhy doporučit k chovu. Rod zahrnuje celkem 32 druhů, z nichž pouze šest má žluté nohy. Kromě tohoto druhu to jsou *H. flavimanus* (Pocock, 1900); *H. xanthopus* (Pocock, 1897); *H. liurus* (Pocock, 1897); *H. madraspatensis* Pocock, 1900 a *H. ubicki* Kovařík, 2004.

František Kovařík

